

AFIDINA QUICK

(Microincapsulato)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGETICA AZIONE DI CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

AFIDINA QUICK

Registrazione del Ministero della Salute n° 13721 del 16.05.2007

Composizione

| | |
|--------------------|-------------------|
| Clorpirifos puro | 22,6 g (=250 g/l) |
| Deltametrina pura | 0,54 g (= 6 g/l) |
| Coformulanti q.b.a | 100 g |

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P302 + 352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)- Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele

Stabilimento di confezionamento:

KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Distribuito da:

CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)

Contenuto: 100 ml

Partita N. vedi timbro



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS 22,6% e DELTAMETRINA 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLORPIRIFOS: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. Edema polmonare.

Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incoostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

DELTA-METRINA: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

AFIDINA QUICK è una miscela insetticida a base di Clorpirifos-ètile microincapsulato e di Deltametrina. La miscela è dispersa in soluzione acquosa. Il connubio dei due principi attivi fornisce diversi vantaggi quali: la presenza contemporanea di due molecole con diverso meccanismo d'azione, una veloce azione grazie all'effetto abbattente del piretroide e una buona persistenza grazie al fosfororganico microincapsulato.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto va applicato alla vegetazione in modo uniforme, avendo cura di bagnare tutta la superficie fogliare.

Intervenire alla comparsa dei fitofagi o alle prime manifestazioni della loro presenza (rosure, accartocciamenti fogliari etc.).

Agrumi (escluso mandarino): contro Cocciniglie, Dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), Aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di **140 ml/ha**. Formiche (formica argentina): contro quest'insetto applicare il prodotto sul tronco. **Dose: 280 ml/ha**.

Vite da vino: contro Tignola (*Eupoecilia ambiguella*), Tignoletta (*Loebesia botrana*) e Cicaline (*Empoasca flavescens*, *Zygina ramni*, *Scaphoideus titanus* e *Metcalfa pruinosa*), Tripide. **Dose: 120-140 ml/ha**.

Melanzana, Carota, Cipolla, Asparago: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Nottue (es. *Agrotis* spp., *Spodoptera*) Neanidi di 1ma età e adulti di Mosche bianche (*Trialeurodes vaporariorum*), Cimice verde (*Nezara viridula*), Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha**.

Patata: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Nottue (es. *Agrotis* spp.), Tignola (*Phthorimaea operculella*), Afidi. **Dose: 1,3 l/ha**.

Pisello, Fagiolo: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Nottue e Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha**.

Mais: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Diabrotica, Afidi. **Dose: 1-1,3 l/ha**.

Tabacco: Nottue, Afidi, Tripidi, Altica (*Epithrix hirtipennis*). **Dose: 1,3 l/ha**.

Floreali e Ornamentali: contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi (es. Bega del Garofano), Nottue, Spodoptera, Ifantria (*Hyphantria cunea*), Cocciniglie, Oziirrinchi. **Dose: 1,3-1,5 l/ha**.

Pioppo: contro Criptorinco (*Cryptorhynchus lapathi*) e Saperda (*Saperda carcharias*). **Dose: 130-150 ml/ha**.

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, mantenendo in agitazione la miscela.

COMPATIBILITÀ

AFIDINA QUICK non è compatibile con i prodotti alcalini.

Avvertenza: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E TABACCO; 30 GIORNI PER VITE DA VINO, PATATA E MAIS; 21 GIORNI PER CAROTA, CIPOLLA; 15 GIORNI PER MELANZANA, PISELLO, FAGIOLO, ASPARAGO.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**