

Cifoumic

Promotore dello sviluppo delle radici adsorbenti

Incrementa il volume di suolo esplorato, grazie ad una maggiore e rapida crescita delle radichette adsorbenti. Potenzia la fertilità del suolo, migliorando la capacità di scambio nella rizosfera.

BIOSTIMOLANTE ai sensi del D.lgs. 75/2010



Componenti: Acidi umici e fulvici.

Modalità d'azione e vantaggi agronomici: CIFOUMIC è un prodotto biostimolante liquido a base di acidi umici e fulvici con diverse azioni positive sulla fertilità del suolo e direttamente anche sulla pianta.

Usato in fertirrigazione il prodotto promuove lo sviluppo delle radichette adsorbenti, incrementando significativamente il volume di suolo esplorato dalle radici della pianta. Inoltre, CIFOUMIC incrementa l'assorbimento dei nutritivi (fosfati, ferro, microelementi, ecc.) attraverso un'azione complessante e protettiva; stimola l'attività dei microrganismi del suolo e ne migliora alcune proprietà come la capacità di scambio cationico e quella di ritenzione idrica.

Su terreni e colture particolarmente intensive, CIFOUMIC svolge un'azione strutturante e "detossificante" nei confronti di xenobiotici e sostanze dannose per piante e terreno.

Analisi e proprietà chimico-fisiche:

Sostanza organica sul tal quale	14%
Sostanza organica sulla sostanza secca	63%
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica totale	86%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	0,7%
Rapporto C/N	45

pH 0.1%	EC 0.1% mS/cm	Densità g/ml
9.54	0.14	1.11

Taglia: 1 kg; 10 kg

Metodo di applicazione: FERTIRRIGAZIONE

Colture	Dose kg/ha	Indicazioni
Piante da frutto, Vite e Olivo	4 - 6	Durante il ciclo colturale, ripetere almeno due volte ogni 10-15 giorni
Orticoltura in serra	0,5 - 1 / 1000 mq	Durante il ciclo colturale, ripetere 2-3 volte ogni 10-15 giorni
Orticoltura in pieno campo	4 - 6	Durante il ciclo colturale, ripetere almeno due volte ogni 10-15 giorni
Colture floricole, ornamentali e vivai	0,5 - 1 / 1000 mq	Durante il ciclo colturale, ripetere 2-3 volte ogni 10-15 giorni
Concia dei semi	1 kg ogni 100 kg di seme con la quantità di acqua necessaria per una bagnatura completa del seme.	

Metodo di applicazione: FOGLIARE

CIFOUMIC si è dimostrato efficace nella prevenzione e controllo del "brusone" fisiologico del pero, mediante applicazione fogliare alla dose di 1,5 kg/ha da ripetere 2-3 volte su varietà sensibili in condizioni di elevata temperatura (> 25 °C) e ventosità nel periodo di inizio estate.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.