

PYRINEX PRONTO

Insetticida liquido pronto all'uso da applicarsi tal quale, dotato di energica azione per contatto, ingestione e inalazione

PYRINEX PRONTO

Registrazione n. 10973 del 12.07.2001
del Ministero della Sanità

Composizione
Clorpirifos-etile puro 0,5 g (=5 g/l)
Coformulant q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 –
Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P391 – Raccogliere il materiale
fuoriuscito. P501 – Smaltire il
contenuto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)

Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer-Sheva – Israele

Distribuito da:

C.I.F.O. S.p.A. - S.Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di confezionamento:

KOLLANT S.r.l – Vigonovo (VE)

Contenuto: 500 ml



ATTENZIONE

ipersecrezione bronchiale. edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia,

convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il PYRINEX PRONTO è un insetticida a base di microcapsule di sostanze polimeriche contenenti Clorpirifos disperse in mezzo acquoso. La particolare formulazione conferisce al prodotto un minor rischio per gli applicatori ed una migliore e più duratura efficacia nei confronti degli insetti. Agisce prevalentemente per contatto e ingestione e in parte per inalazione. Il prodotto è una formulazione pronta per l'uso, da impiegarsi tal quale, senza diluizione in acqua.

La particolare confezione, dotata di erogatore manuale a pressione, consente una facile e rapida distribuzione. In virtù di queste caratteristiche PYRINEX PRONTO si presta agli impieghi nel settore hobbistico, orti, giardini e serre.

Applicato al fogliame delle piante infestate fornisce un buon controllo dei principali fitofagi e una buona selettività nei confronti dell'artropodofauna utile.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto va applicato alla vegetazione in modo uniforme, avendo cura di bagnare tutta la superficie fogliare in modo da coprire la porzione trattata con un film liquido continuo, senza però raggiungere la fase di gocciolamento al suolo del prodotto. Intervenire alla comparsa dei fitofagi o alle prime manifestazioni della loro presenza (rosure, accartocciamenti fogliari, etc.)

AGRUMI: contro Cocciniglie, Dialeurodidi (*Dialeurodes citri*). Aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*), Formiche (*Formica argentina*). Contro quest'ultimo insetto applicare il prodotto sul tronco, partendo dalla base fino alle prime branche; se vi è una presenza significativa dell'Imenottero irrorare anche il fogliame, soprattutto i germogli.

MELO e PERO: contro Verme delle mele (*Cydia pomonella*), Psilla (*Cacopsilla pyri*), Tortricidi (es. *Archips spp.*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosus*). Il trattamento è consentito solo fino alla fase di pre-fioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.

PESCO: contro Tignola orientale (*Cydia molesta*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*) e Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosus*). Il trattamento è consentito solo fino alla fase di pre-fioritura

POMODORO, PEPPERONE, MELANZANA: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Nottue (es. *Agrotis spp.*), neanidi di 1ª età e adulti di Aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*),

Cimice verde (*Nezara viridula*). Per pomodoro e peperone il trattamento è consentito solo fino alla fase di pre-fioritura

PATATA: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Nottue (es. *Agrotis spp.*), Tignola (*Phthorimaea operculella*).

FAGIOLO e PISELLO: contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*) e Nottue (es. *Agrotis spp.*).

FLOREALI E ORNAMENTALI: contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi (es. Bega del Garofano), Nottue, Cocciniglie, Oziurini.

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per melo, pero e pesco, 60 giorni prima della raccolta per agrumi; 30 giorni per patata; 21 giorni per pomodoro e peperone; 15 giorni per melanzana, pisello, fagiolo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque superficiali. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo,